



肥進(微)字第0826076號

肥料品目(編號)：雜項次量微量元素肥料(4-41)

登記成分：全氮11.0%，全磷酐42.0%，全氧化鉀11.0%，全銅0.01%(100mg/kg)

即溶速效型 **微晶體** 肥料 **WS NPK**


IPE 優速高磷

產品特點 •

■ 磷是作物栽培上極為重要的一種植物生長所需成份，但磷時常受到土壤的酸鹼問題，被土壤固定成不活化型態。IPE優速高磷的IPE技術，是針對此問題所進行研發出的特殊技術，施用於土壤後，不僅不用擔心磷肥因為被土壤固定變成非活化態，其中IPE技術所附帶的特殊打破固化成份，更可以幫助土壤釋放出原被固定的磷素，提高根系獲取磷肥的功效，對作物的生長發育幫助的積極面是有正向幫助，即使後面減少磷肥施用的情況下，亦不會影響土壤磷肥的效能。

使用方法 •

■ IPE優速高磷可施用於各種作物，包含果樹、蔬菜、觀賞植物等栽培作物，本產品含水溶性三要素與螯合態的微量元素，可用於灌溉施肥及葉面噴施，用量需依作物需求、土壤種類及土壤肥力而定。
 ■ 以葉面噴施的方式施用時，使用量為每公頃1-2公斤，可依施用習慣與需求做調整。以灌溉方式施用時，使用量為每公頃25-50公斤。
 ■ 一般施用時，可以視作物生長狀況稀釋為800-1500倍。



施用作物	使用時期
果樹	花芽分化期前施用；依照個季節生長所需施用。
落花生、玉米	定植後或本葉3枚以上開始施用，期間每隔20-25天可依照實際生長情況單獨施用或與其他肥料混用。
茄果類	定植後或本葉3枚以上開始施用，期間每隔15-20天可依照實際生長情況單獨施用或與其他肥料混用。
瓜果類	定植後或本葉3枚以上開始施用，期間每隔15-20天可依照實際生長情況單獨施用或與其他肥料混用。

注意事項 •

■ 需存放於涼爽乾燥的地方，勿直接日照曝曬。
 ■ 本產品含銅，超量施用有毒害，造成土壤污染，請依肥料使用方法及使用量施用：
 • 應依稀釋倍數稀釋至安全量使用；採收前一週，不得噴灑於食用部位。
 ■ 使用完本產品後需徹底清洗雙手。
 ■ 第一次施用或與其他農藥混合使用前，請先小範圍測試。



全農肥料有限公司 電話(05)5261187 <http://www.agriall.com.tw/>



www.agriall.com.tw