

Praten 80 變得更好用了

高稀釋倍數(3000-10000倍)使用於一般用途 低稀釋倍數(700-1000倍)使用於專門用途!

多用途機能性展著劑

請依目的使用

Praten80



專給受到
以下困擾的人

- 覺得展著劑要分別效用來使用很麻煩的人
- 擔心藥劑髒污的人
- 噴藥後遇到下雨而擔心其效用的人
- 想提升藥劑效果的人
- 遇到不易附著的藥劑產品的人



適用農藥

適用作物

稀釋倍數

殺菌劑・殺蟲劑

藥液難附著的作物
(稻米・高麗菜・蔥・芋頭等)

3000-5000倍

藥液易附著的作物
(果樹・葉菜)

5000-10000倍

MEP劑

葡萄
(天牛防治)

700-1000倍

TPN劑

茶
(輪斑病防治)

800倍



サンケイ化学株式会社

東京・大阪・名古屋・仙台

Praten80

特徵


具良好的浸透力

可使用於藥液難附著的作物上，耐雨性也絕佳


藥劑	添加Praten80時	添加其他展著劑	只加水時
浸透力	提高藥劑的浸透力，藥效擴散直達作物組織內	雖有良好附著力，但只附著於作物表面，浸透力差	因表面張力較大的緣故附著性差
浸透			
力			

藥劑	添加Praten80時	添加其他展著劑	只加水
效果	無論使用於任何作物其附著性佳，可使藥液均勻附著。藥液乾後因其絕佳耐雨性，遇雨時可防止流失	雖然附著力佳，但使用於不同作物上時，會有附著效果不佳的情況。藥液乾後的耐雨性相對較差	藥液的附著性差，也無法均勻附著，因此可明顯看到藥斑。有附著到作物上的藥液部份，其耐雨性相對高一點
適用作物	 (所有作物均可使用)	 (有些作物不適用)	
附著性	 (均勻附著)	 (均勻附著)	 (會有斑點)
耐雨性	 (遇雨不流失)	 (遇雨易流失)	 (遇雨不易流失)

浸透力的比較



降雨前後的藥劑附著量



使用上注意事項

1. 若當成一般展著劑來使用則會有藥害發生的可能性，請避免高濃度的使用(1000倍以下)，以3000倍以上來使用。
2. 若添加進易產生藥害的藥劑使用時，可能助長藥害的發生請避免使用。
3. 請依本劑載明適用藥劑內容使用並遵照注意事項。

★ 請詳讀標示。 ★ 除標示上記載外不適用。 ★ 請放置於小孩伸手不及之處。