



金力駭

低溫高壓冷榨苦棟油
添加天然無患子液乳化

產品特點

金力駭是利用低溫冷萃的方式，將印度苦棟子的天然驅蟲物質，充分的保存下來。施用後對人畜無毒；金力駭所使用的乳化劑亦是採用天然的無患子液，全產品完全來自天然植物性成分，適合各種追求食安與無毒栽培的農民或農事作業使用。金力駭對於蚜蟲、薊馬與紅蜘蛛等小型害蟲具有絕佳的物理性防除效果，噴灑後的苦棟油氣味亦可以對害蟲產生趨避作用，連續性的全株噴灑後對於擾人的白粉病亦有預防效果。

- ◆ANH冷壓技術完整保留苦棟富含之天然驅蟲物質，對人畜安全無害。
- ◆本產品添加天然無患子液，加水稀釋後即有乳化效果且可立即使用。

使用方法

- ◆稀釋倍數：一般推薦稀釋倍數為200-500倍，若有添加其他成分應該提高稀釋倍數。
- ◆使用方法：將金力駭依照推薦倍數充分攪拌稀釋後，均勻噴灑於全株作物（包含葉片正反面）直到完全濕潤並且選用清晨或下午氣溫較低的時間施用，應該避開中午高溫時段。
- ◆蟎類、蚜蟲：初見蟲體發生時立即使用，依照危害程度每2-5天噴灑一次效果最佳，並且應照危害程度減弱後，可將預防性噴灑作業拉長為7-14天一次。
- ◆其他蟲害或驅避防護：依照危害程度情況，每7-14天定期噴灑一次。已發生區以每7天噴灑一次，待蟲害問題抑制或減弱後可調整為每7-14天噴灑一次做為預防性噴灑。

施用作物	使用時期
設施栽培	生長發育期間，視植株發育情況每7-14天或5-10天施用一次。
各類葫蘆科 茄科作物	依照各類不同栽培需求（蚜蟲、介殼蟲、銀葉粉蝨等），每5-10全株噴灑。
育苗	生長發育期間，視苗株情況每7-14天一次。
草莓	視情況每7-10天施用一次，在紅蜘蛛好發生期頻度可調整為5天一次。

注意事項

- 1、如氣溫低於10°C有凝固現象時，屬正常物理現象，將瓶罐浸於熱水中即可融化。
- 2、若不慎濺及眼睛，請立即用清水清洗，若有過敏或刺激反應請立刻送醫處理。
- 3、請存放於涼爽乾燥的地方，不用時密閉瓶蓋，貯存於陰涼安全場所。
- 4、本產品滲透力強，使用時不可再加展著劑，以免效果過強，產生藥害。

登錄字號：植保進字第00029號

產品類別：免登記植物保護資材

成份：冷壓苦棟油80%、無患子液20%



全農肥料有限公司

電話(05)5261187

<http://www.agriall.com.tw/>

