

肥進(微)字第0826125號
肥料品目：鈣液肥(4-16)
登記成分：水溶性氧化鈣21.0%



產品特點

黃腐酸是來自天然腐植質層中的大分子聚合物，一般所熟知的功效包含了針對土壤的理化性質的改善，增加土壤緩衝力、提高作物對營養元素的吸收以及增強作物的根圈發展的活力，使作物對不良環境的抗性更加以外，黃腐酸具有更強大的生物活性，且可以直接受。灑樂鈣是品質精良的黃腐酸螯合鈣液肥，結合黃腐酸的高生物活性，將鈣元素鉗住使其不易被其他干擾元素擷取，而且利用黃腐酸的生物活性將鈣元素帶入植物體內，迅速補充生長發育所需的鈣元素。

使用方法

- * 適合使用於葉面噴灑或養液灌溉系統。
- * 每分地建議使用量為0.5-1公升或稀釋800-1500倍後做全株噴灑。
- * 鈣缺乏症發生期與作物發育對鈣肥需求較大時期，可依照實際作物發育情況每10-14天施用1次，易發生鈣缺乏症時期亦可以縮短為7-10天施用1次。
- * 當與其他液體肥料混用時，需作相容性測試，並先小範圍測試。

各類果樹

幼果期、果實膨大期、採收前做全株噴灑。

小番茄與其他茄科作物

定植後第7-10開始施用，第一房花開始追加1次，生長期間每7-10天重複施用1次。每次採收後可以再追1次。

葫蘆科作物

定植後第7-10開始施用，第14天再追施1次。授粉後幼果期追施1次，中果期再追施1次。

蔬菜

定植後第5-7天開始施用(本葉第3枚開始施用)，發育期間每7-10天施用一次。栽培期較短的蕹菜可以在萌芽後第3天開始施用以降低生長迅速缺鈣所造成的葉片劣變情況。結球類蔬菜可以在結球期每3-5天密集施用2-3次降低黑心(凹心)的情況。

茶樹

春梢萌發前與春肥一起施用1次，每次修剪完或茶菁採收完再追加1次，冬茶菁生產期間，寒流前再追施1次。

花生

於第一次追肥(或始花期)做1次噴灑作業，每分地0.5-1公升。

注意事項

- * 請將產品存放於涼爽乾燥的地方，勿直接日照曝曬。
- * 使用前請搖勻。
- * 使用完本產品後需徹底清洗雙手。
- * 第一次施用或與其他農藥混合使用前，請先小範圍測試。



www.agriall.com.tw



全農肥料有限公司

電話 (05) 5261187 <http://www.agriall.com.tw/>

澳洲進口 優質黃腐酸螯合鈣液肥

灑樂鈣

