


作物補鈣新選擇

鈣享亮

更好移行的螯合鈣

100%
水溶性

生物可降解
IDHA螯合微量元素



鈣享亮的IDHA螯合劑特點

- 1、鈣是容易被磷、鉀鹽類固定成很難吸收的非離子態的元素。
- 2、鈣享亮的IDHA螯合劑配方讓鈣不被固定，而且移行快。
- 3、好移行的鈣肥，讓植物真的吃得到鈣肥，更不會產生缺鈣問題。
- 4、IDHA配方更不受水質酸鹼值影響，比EDTA配方更穩定，效果更好。
- 5、螯合鈣吸收好、效益高，用更省的量來降低成本，達到更好的品質。
- 6、鈣享亮是IDHA的微量元素複方，讓植物不僅不缺鈣、還可避免缺素症。
- 7、一甲地1-2公斤，更省錢的補鈣好選擇，大田栽培最適合。

使用方法

本產品為100%水溶性生物可降解IDHA螯合微量元素可施用於果樹、蔬菜、觀賞植物等各種作物，依需求灌溉施肥及葉面噴施，用量需依作物需求、土壤種類及肥力而定。請依照作物需求的不同，稀釋1500-2000倍後，進行葉面噴灑；一般田間的使用量為每公頃1-2公斤，請依作物對微量元素的需求做調整。

登記成分

水溶性氧化鈣9.5%，水溶性鐵0.05%，水溶性錳0.10%、水溶性硼0.50%，水溶性鉬0.010%，全鈣0.05% (500mg/kg)，全鋅0.05% (500mg/kg)。

注意事項

- 本產品含硼、鉬、銅、鋅，超量施用有毒害，造成土壤污染，請依肥料使用方法及使用量施用；應依稀釋倍數稀釋至安全量使用；採收前一週，不得噴灑於食用部位。
- 第一次與農藥或肥料混合使用前，請先測試相容性並小範圍測試施用。
- 需存放於涼爽乾燥處，勿直接日照曝曬。使用完空瓶袋勿隨意棄置，清洗整理後妥善分類回收。

肥料品目(編號) 雜項次量微量元素肥料(4-41) / 肥料登記證字號 肥進(微)字第0826230號

施用時機推薦

芒果、芭樂、紅龍果 文旦、桃、葡萄	座果後、幼果期、果實膨大期，可分3-4次施用。 葉施：1500-2000倍；土壤澆灌1000-1500倍， 或依推薦量每公頃1-2公斤。	萆菜	生長期間每10-14天重複施用一次。 葉施：1500-2000倍；土壤澆灌 1000-1500倍，或依推薦量每公頃1-2公 斤。
白菜、油菜、美生菜 高麗菜、包心白菜	*短期蔬菜：本葉三枚施用1-2次。 *結球類蔬菜：定植後本葉第3-4枚、葉片發育盛 期、結球前共施用3-4次，盡早使用降低心腐。 葉施：1500-2000倍；土壤澆灌1000-1500倍，或 依推薦量每公頃1-2公斤。	水稻	定植成活後、望花期、授粉後各追施一次。 每甲地1公斤。葉施：1500-2000倍；土壤 澆灌1000-1500倍，或依推薦量每公頃 1-2公斤。
小果番茄、小黃瓜 草莓	座果後、中果期間施用2-3次。 葉施：1500-2000倍；土壤澆灌1000-1500倍，或 依推薦量每公頃1-2公斤。	小麥	發芽後本葉期、發芽後第25-30天各追施 一次。每甲地1公斤。葉施：1500-2000倍； 土壤澆灌1000-1500倍，或依推薦量每公 頃1-2公斤。
地瓜、芋頭、馬鈴薯	*地瓜：定植成活後、弄藤、定植後50-60天共3次。 *芋頭：定植成活後每20天追施1次，共3-4次。 *馬鈴薯：萌芽展葉期、定植後第45天，共2-3次。 葉施：1500-2000倍；土壤澆灌1000-1500倍，或 依推薦量每公頃1-2公斤。	玉米	發芽後、公花抽穗前各噴一次。每甲地1-2 公斤。葉施：1500-2000倍；土壤澆灌 1000-1500倍，或依推薦量每公頃1-2公 斤。

全農肥料有限公司

電話：(05)5261187 網址：www.agriall.com.tw

